

क्वींसलैंड फ्रूट फ्लाय (फल मक्षिका) का प्रबंधन

AGRICULTURE VICTORIA

हिंदी में जानकारी

क्वींसलैंड फ्रूट फ्लाय विक्टोरिया में पाई जाती है और कई फलों और सब्जियों पर हमला करती है। यह तथ्य पत्रक आपको अपने बगीचे में क्वींसलैंड फ्रूट फ्लाय की तलाश करने और फलों और सब्जियों को नुकसान से बचाने में मदद करेगा।

क्वींसलैंड फ्रूट फ्लाय कैसी दिखती है?

क्वींसलैंड फ्रूट फ्लाय के जीवन में चार चरण होते हैं। मौसम की समुचित स्थिति में (यानि 26 डिग्री सेल्सियस) में फ्लाय (मकखी) 30 दिनों में अंडे से वयस्क में बदल सकती है।



1. अंडा: क्वींसलैंड फ्रूट फ्लाय मेजबान फल और सब्जियों के अंदर सफेद, केले की आकृति के अंडे देती है। एक मादा प्रतिदिन 100 अंडे दे सकती है। अंडों की लंबाई 1 मिमी होती है और ये कठिनाई से दिखाई देते हैं।



2. इल्ली: हरेक अंडे से एक छोटी, क्रीम रंग की इल्ली पैदा होती है। इल्लियाँ फल खाती हैं, जिससे यह अंदर से सड़ जाता है। इल्लियाँ अधिकतम 9 मिमी की लंबाई तक बढ़ती हैं। पूरी तरह से विकसित हो जाने पर इल्ली फल से बाहर निकलती है और खुद को मिट्टी में दबा लेती है।



3. प्यूपा: मिट्टी में पहुँचने के बाद इल्ली एक अंडाकार, भूरे रंग के, कठोर प्यूपा में बदल जाती है। प्यूपाल कोष के अंदर, वयस्क क्वींसलैंड फ्रूट फ्लाय विकसित होती है।



4. वयस्क: क्वींसलैंड फ्रूट फ्लाय की लंबाई लगभग 7 मिमी होती है और इसका शरीर लाल-भूरे रंग का होता है, जिसपर विशिष्ट पीले रंग के निशान होते हैं।

क्वींसलैंड फ्रूट फ्लाय को वसंत, गर्मी और जाड़े के मौसम में बगीचों में देखा जा सकता है।

क्वींसलैंड फ्रूट फ्लाय के लिए घर में उगने वाले सामान्य मेजबान

क्वींसलैंड फ्रूट फ्लाय विभिन्न फलों और सब्जियों के अंदर अंडे देती है - इन्हें 'मेजबान' कहा जाता है। सामान्य रूप से उगने वाले कुछ उदाहरण नीचे दिखाए गए हैं।



मेजबानों की पूरी सूची वेबसाइट www.agriculture.vic.gov.au/qff पर उपलब्ध है।

क्वींसलैंड फ्रूट फ्लाइ (फल मक्षिका) का प्रबंधन

1. पहले क्वींसलैंड फ्रूट फ्लाइ की उपस्थिति के लिए देखें

जाल: अपने बगीचे में क्वींसलैंड फ्रूट फ्लाइ की उपस्थिति की जाँच करने के लिए क्वींसलैंड फ्रूट फ्लाइ जाल लगाएँ। पास के छायादार, सदाबहार पेड़ में लगभग 1.5 मीटर की ऊँचाई पर जाल को लटकाएँ। वसंत की शुरुआत में यह करें और सर्दियों तक जारी रखें।

क्वींसलैंड फ्रूट फ्लाइ को आकर्षित करके पकड़ने के लिए कई अलग-अलग तरह के जाल उपलब्ध हैं। ये जाल आपके बगीचे के लिए अच्छा काम करने वाले अन्य कीटों को भी आकर्षित करके उन्हें फसा सकते हैं, इसलिए अपने पेड़ों या पौधों पर किसी भी कीटनाशक का उपयोग करने से पहले इस बात की जाँच कर लें कि क्या आपने वहाँ क्वींसलैंड फ्रूट फ्लाइ को पकड़ा है।

2. नियंत्रण विधियाँ

यदि आपको अपने बगीचे में क्वींसलैंड फ्रूट फ्लाइ होने का पता चलता है, तो आपको कई प्रकार की नियंत्रण विधियों के संयोजन का उपयोग करके सबसे अच्छा नियंत्रण प्राप्त हो सकेगा। फलों के पकने से कम से कम 6-8 सप्ताह पहले नियंत्रण विधियाँ शुरू करें, क्योंकि क्वींसलैंड फ्रूट फ्लाइ सख्त, हरे रंग के फलों के अंदर अंडे दे सकती है।

बहिष्करण सबसे अच्छा रहता है: फल के परागण के बाद फल को ढकने के लिए कीट जाल, बैग या स्लीव का उपयोग करें, ताकि क्वींसलैंड फ्रूट फ्लाइ फलों और सब्जियों के अंदर अंडे न दे सके। जाल और फल का एक-दूसरे से स्पर्श न होने दें।

कीट जाल



चारा, जाल और कीटनाशक: क्वींसलैंड फ्रूट फ्लाइ के फल पर आक्रमण से पहले जाल और चारा उन्हें आकर्षित करके पकड़ सकते हैं। मादा और नर, दोनों लिंगों की फ्लाइ (मक्खियाँ) को नष्ट करने में सक्षम जाल की खोज करें। केवल जालों का उपयोग करने से ही संभावित रूप से फ्रूट फ्लाइ का नियंत्रण नहीं हो सकता है।

क्वींसलैंड फ्रूट फ्लाइ को नष्ट करने के लिए कीटनाशक भी उपलब्ध हैं। यदि कीटनाशकों का गलत तरीके से उपयोग किया जाता है, तो ये हानिकारक हो सकते हैं - लैबल पर दिए गए निर्देशों को पढ़कर उनका पालन करें।

ये सभी उत्पाद नर्सरी, घरेलू बगीचा स्टोर और ऑनलाइन खुदरा विक्रेताओं से खरीदे जा सकते हैं।

3. अपने फलों और सब्जियों की जाँच करें

फलों/सब्जियों की त्वचा/छिलके पर डंक के निशान और उनके अंदर इल्लियों के लिए देखें।

डंक के निशान



4. आवश्यक उद्यान देखभाल (अच्छी स्वच्छता)

जैसे ही फल पकें, उन्हें तोड़ लें। जो फल और सब्जियाँ सड़ गई हैं, जमीन पर गिरी हुई हैं और जिन्हें आप नहीं खाना चाहते/चाहती हैं, उन सभी को हटा दें। इससे क्वींसलैंड फ्रूट फ्लाइ के आपके बगीचे में प्रजनन करने से रोकथाम हो पाएगी।

फलदार पेड़ों की कंटाई-छंटाई करें ताकि आप फल तोड़ने के लिए उन तक पहुंच सकें, अथवा कीट जाल लगाएँ या छिड़काव करें।

फलों को फेंकने से पहले आपको उनके अंदर उपस्थित सभी इल्लियों को नष्ट करना होगा। यह फ्रीज करने, माइक्रोवेव करने, उबालने या सोलराइज़ करने (प्लास्टिक बैग के अंदर फल को सील करके कम से कम 14 दिनों के लिए धूप में रखने) के तरीकों से किया जा सकता है। ऐसा करने के बाद फल को बैग में रखकर आपके अपशिष्ट बिन में डाला जा सकता है।

क्वींसलैंड फ्रूट फ्लाइ द्वारा संक्रमित या क्षतिग्रस्त फलों और सब्जियों की खाद न बनाएँ।

यदि आप अपने फलों और सब्जियों के पेड़ों की देखभाल नहीं कर सकते/सकती हैं, तो उनके स्थान पर ऐसे पौधे लगाएँ जो मेजबान न हों और केवल सजावटी हों (जैसे स्वदेशी वाटल या ग्रीविलिया)।

क्वींसलैंड के फ्रूट फ्लाइ का फैलाव न करें

क्वींसलैंड फ्रूट फ्लाइ के नई जगहों पर फैलाव की रोकथाम करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि मेजबान फलों या सब्जियों के साथ यात्रा न की जाए, विशेषकर जिन्हें घर पर उगाया गया है।

कुछ क्षेत्रों में यदि आपको मेजबान उपज के साथ यात्रा करते हुए पाया जाता है, तो जुर्माने लागू हो सकते हैं - विवरण के लिए वेबसाइट www.interstatequarantine.org.au देखें।

और अधिक जानकारी वेबसाइट www.agriculture.vic.gov.au/qff पर देखी जा सकती है या ग्राहक सेवा केंद्र को 136 186 पर कॉल करके प्राप्त की जा सकती है।

विक्टोरियाई रोजगार, परिसर और क्षेत्र विभाग (Victorian Department of Jobs, Precincts and Regions), 1 स्पिंग स्ट्रीट, मेलबर्न द्वारा मार्च 2020 में प्राधिकृत और प्रकाशित

© विक्टोरिया राज्य रोजगार, परिसर और क्षेत्र विभाग 2020 (The State of Victoria Department Jobs, Precincts and Regions 2020)